



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД САРАТОВ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА**

410056, г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., 4, тел.: (845-2) 39-29-00, факс: (845-2) 23-33-90,  
e-mail: [okt.orgotdel@yandex.ru](mailto:okt.orgotdel@yandex.ru), ОКПО 04040634; ОГРН 1026403364129; ИНН/КПП 6454020094/645401001

13.10.2023 № 04-14/2145

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Руководителям муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»**

Отдел образования администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» направляет памятку по профилактике энтеровирусной инфекции в домашнем очаге Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Саратовской области в г. Саратове для санитарно-просветительской работы среди населения г. Саратова.

Прошу довести информацию до заинтересованных лиц, а также разместить на официальных сайтах учреждений.

Приложение: направлено в электронном виде.


Начальник отдела образования

Н.А. Базарова

# ТЕКУЩАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ДОМАШНЕМОЩАГЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

**ТЕКУЩАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ** в домашнем очаге проводится членами семьи в присутствии больного с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к применению в установленном порядке и обладающих вирулицидными свойствами, — в соответствии с инструкцией/методическими указаниями по их применению.

- Больного изолируют, помещая в отдельную комнату или в отгороженную ее часть.
- Лицо, ухаживающее за больным, должно соблюдать правила личной гигиены. К уходу за больным в домашнем очаге не допускаются дети.
- При уходе за больным, при контакте с предметами в окружении больного (одежда больного, постельные принадлежности, дверные ручки и т.п.), рекомендуется пользоваться одноразовыми медицинскими масками (или четырехслойной марлевой маской), надевать резиновые перчатки. По завершении работы руки в перчатках следует обработать салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства, снять перчатки, вымыть руки и обработать их кожным антисептиком.
- Для больной с энтеровирусной инфекцией выделяется отдельная столовая посуда и приборы для приема пищи, декоратив, индивидуальное полотенце, постельные принадлежности, одноразовые носовые платки.
- Для проведения текущей дезинфекции в домашних условиях для обеззараживания вещей больного с использованием моющего или дезинфицирующего средства, добавления моющего или дезинфицирующего средства.
- Посуду больного дезинфицируют кипячением в 2% растворе пищевой соды в течение 30 мин. или путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием. Прочисляют посуду в вертикальном положении, не вытирая ее полотенцем.
- Используют белое белье складывают в отдельную емкость с крышкой. Обеззараживание белья перед стиркой осуществляют кипячением в 2% растворе кальцинированной соды или 0,5% растворе любого моющего средства в течение 30 минут с момента закипания, затем стирают и высушивают.
- Предметы ухода за больным, игрушки обеззараживают способом погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием.
- Обработку рук больного, а также рук лиц, ухаживающего за ним, проводят с использованием мыла, растворов антисептиков, гелей, дезинфицирующих салфеток с вирулицидным эффектом.
- Медицинские маски меняют через каждые 4 часа. Резиновые перчатки многократного использования, не снимая с рук, протирают дезинфицирующим средством, снимают, погружают в раствор дезинфицирующего средства, промывают под проточной водой, высушивают. Одноразовые перчатки и маски после обеззараживания уничтожают.
- В помещениях, где находится больной, ежедневно проводят влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и проветривают его как можно чаще (не менее 4-х раз в день).
- Санитарно-техническое оборудование (умывальник, унитаз, биде, рапы, ручки) обрабатывают с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
- После проведения уборки уборочный инвентарь кипятят в отдельной посуде не менее 15 минут либо погружают в раствор дезинфицирующего средства. После дезинфекции его прополаскивают, высушивают и хранят в сухом виде в специально выделенной для этого отдельной емкости.
- При отсутствии канализации выделения больного собирают в отдельные емкости и заливают (засыпают) дезинфицирующими средствами (хлорная известь, гипохлорит кальция и др.), после чего емкости опорожняют и обеззараживают, заполняя их дезинфицирующим раствором. Обязательной дезинфекции с применением дезинфицирующих средств подлежат надворные санитарные установки и выгребные ямы.



## ВАЖНО!

Больного изолируют, помещая в отдельную комнату или в отгороженную ее часть. Для больного с энтеровирусной инфекцией выделяется отдельная столовая посуда и приборы для приема пищи, лекарств, индивидуальное полотенце, постельные принадлежности, одноразовые носовые платки.

Лично, ухаживающее за больным, должно соблюдать правила личной гигиены

Необходимо соблюдать концентрацию и время обработки в соответствии с инструкцией на дез средство

Для приготовления раствора необходимо иметь мерную емкость с отметкой необходимого количества средства.

Дезинфектанты можно применять методом протирания, орошения (распыления).

Телефон (8452) 39-38-78  
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, 69  
email: [buiz@vigitena-saratov.ru](mailto:buiz@vigitena-saratov.ru)  
[www.vigitena-saratov.ru](http://www.vigitena-saratov.ru)

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Саратовской области»

## ПАМЯТКА

### ТЕКУЩАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ДОМАШНЕМ ОЧАГЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Текущая дезинфекция в домашнем очаге проводится членами семьи в присутствии больного.

#### Как правильно обрабатывать уборочный инвентарь после уборки)

↓ После проведения уборки уборочный инвентарь кипятят в отдельной посуде не менее 15 минут либо погружают в раствор дезинфицирующего средства. После дезинфекции его прополаскивают, высушивают и хранят в сухом виде в специально выделенной для этого отдельной емкости.




УБОРКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ  
НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:  
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ, ПЕРЧАТОК

### Какие средства применять для дезинфекции?

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусных инфекций, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с инструкцией по применению. Для дезинфекции могут быть использованы:

- ✦ Хлорсодержащие средства: таблетки на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты в концентрации не менее 0,06% Део-хлор, Хлормисепт Р и другие; Хлорамин Б в концентрации активного хлора не менее 3%
- ✦ Кислородосодержащие средства-перекись водорода в концентрации не менее 3,0%



### Как хранить дез раствор?

- ✦ Дезинфицирующий раствор следует хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости.

### Как часто проводить дезинфекцию?

- ✦ Проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением дезинфицирующих средств.
- ✦ Протирать дезинфицирующим средством один раз, в конце дня, поверхности, с которыми соприкасаются больной, чаще всего-дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.

### Как мыть и дезинфицировать посуду?

- ✦ Посуду больного дезинфицируют кипячением в 2% растворе пищевой соды в течение 30 мин. или путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием. Просушивают посуду в вертикальном положении, не вытирая ее полотенцем.

### Как провести дезинфекцию сан-тех оборудования?

- ✦ Санитарно-техническое оборудование (умывальник, унитаз, биде, краны, ручки) обрабатывают с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

### Как стирать белье?

- ✦ Использованное белье больного складывают в отдельную емкость с крышкой. Обеззараживание белья перед стиркой осуществляют кипячением в 2% растворе кальцинированной соды или 0,5% растворе любого моющего средства в течение 30 минут с момента закипания, затем стирают и высушивают.

## ВАЖНО!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБРАБОТАТЬ КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ РУКИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ.

